



Date d'édition : 05/07/2018
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540004418>

FORET DOMANIALE DE CHIZE (Identifiant national : 540004418)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 05990419)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : JEAN TERRISSE (LPO), - 540004418, FORET DOMANIALE DE CHIZE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 19P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540004418.pdf>

Région en charge de la zone : Poitou-Charentes
 Rédacteur(s) : JEAN TERRISSE (LPO)
 Centre de calcul : 385134*-2129548*

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 24/04/2003

Date actuelle d'avis CSRPN : 24/04/2003

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 18/06/2014

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 19 |
| 9. SOURCES | 19 |

190



Date d'édition : 05/07/2018
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540004418>

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Charente-Maritime
- Département : Deux-Sèvres
- Commune : Beauvoir-sur-Niort (INSEE : 79031)
- Commune : Brieuil-sur-Chizé (INSEE : 79055)
- Commune : Secondigné-sur-Belle (INSEE : 79310)
- Commune : Boisserrolles (INSEE : 79039)
- Commune : Prissé-la-Charrière (INSEE : 79078)
- Commune : Villeneuve-la-Comtesse (INSEE : 17474)
- Commune : Marigny (INSEE : 79166)
- Commune : Chizé (INSEE : 79090)
- Commune : Villiers-en-Bois (INSEE : 79350)
- Commune : Fosses (INSEE : 79126)
- Commune : Belleville (INSEE : 79033)
- Commune : Vert (INSEE : 79346)
- Commune : Saint-Séverin-sur-Boutonne (INSEE : 17401)

1.2 Superficie

5448,67 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 50

Maximale (mètre): 98

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Hêtraie calcicole, chénaie-charmaie neutrophile et chénaie pubescente sur calcaires jurassiques.

INTERET BOTANIQUE :

- sur le plan phytocénologique : échantillon régional le plus étendu et le plus représentatif du RUBIO PEREGRINAE-FAGETUM SYLVATICAE; hêtraie thermophile aux marges sud-occidentales de l'aire d'indigénat du Hêtre en contexte thermo-atlantique ;

- sur le plan floristique : très grande richesse de la hêtraie et des ourlets calcicoles thermophiles avec la présence de nombreuses plantes rares/menacées au niveau régional : ORGE D'EUROPE et BELLADONNE, éléments à affinités montagnardes de la hêtraie, mais également SCORZONERE D'ESPAGNE, ASTRAGALE POURPRE et tout un cortège d'espèces méridionales ou "steppiques-continentales" en limite d'aire ou en aire disjointe.

Site ayant très fortement souffert de l'ouragan séculaire du 27 décembre 1999, certaines parcelles de futaie étant détruites à 90%.

Impact négatif indirect des travaux de débardage et d'évacuation des chablis à l'aide d'engins motorisés lourds tassant et défonçant le sol forestier sur de grandes surfaces.

Incertitudes sur les perspectives de replantation des parcelles détruites dans un contexte climatique et édaphique très peu favorable au Hêtre (risques d'emésinement ?).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Forêt domaniale
- Réserve nationale de chasse et de faune sauvage
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse
- Circulation routière ou autoroutière
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre englobe l'ensemble de l'entité boisée continue.

4. FACTEURS INFLUENÇANT L'ÉVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Route | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Coups, abattages, arrachages et déboisements | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Plantations, semis et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Catastrophes naturelles | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nullé | Faible | Moyen | Bon |
|-----------------------------|------------------|-------|-----------------|
| - Algues | - Basidiomycètes | | - Phanérogames |
| - Amphibiens | | | - Ptéridophytes |
| - Autre Faunes | | | |
| - Bryophytes | | | |
| - Lichens | | | |
| - Mammifères | | | |
| - Oiseaux | | | |
| - Poissons | | | |
| - Reptiles | | | |
| - Mollusques | | | |
| - Crustacés | | | |
| - Arachnides | | | |
| - Myriapodes | | | |
| - Odonates | | | |
| - Orthoptères | | | |
| - Lépidoptères | | | |
| - Coléoptères | | | |
| - Diptères | | | |
| - Hyménoptères | | | |
| - Autres ordres d'Hexapodes | | | |
| - Hémiptères | | | |
| - Ascomycètes | | | |
| - Autres Fonges | | | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 34.4 Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles | | | | |
| | 41.1 Hétraies | | | | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 41.7 Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes | | | | |
| | 83.31 Plantations de conifères | | | | |
| | 22.13 Eaux eutrophes | | | | |
| | 31.8 Fourrés | | | | |
| | 86.2 Villages | | | | |
| | 87 Terrains en friche et terrains vagues | | | | |
| | 41.2 Chênaies-charmaies | | | | |
| | 41.3 Frênaies | | | | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 81 Prairies améliorées | | | | |
| | 82 Cultures | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

292

7. ESPÈCES

7.1 Espèces déterminantes

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 84318 | <i>Asperula odorata</i> L., 1753 | Belle-étolie, Gaillet odorant | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BIGET P. | | | | 1984 - 1991 |
| 84675 | <i>Aster linosyris</i> (L.) Bernh., 1800 | <i>Aster linosyris</i> à feuilles de Lin | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79) | | | | |
| 84869 | <i>Astragalus monspessulanus</i> L., 1753 | Astragale de Montpellier, Escarcelle bâtarde | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONTRE E. | | | | |
| 84890 | <i>Astragalus purpureus</i> Lam., 1783 | Astragale pourpre | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONTRE E. | | | | |
| 85152 | <i>Atropa belladonna</i> L., 1753 | Belladone, Bouton-noir | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BIGET P. | | | | |
| 87053 | <i>Bupleurum gerardi</i> All., 1773 | Buplevre de Gérard | Reproduction indéterminée | Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79) | | | | |
| 88691 | <i>Carex montana</i> L., 1753 | Latrèche des montagnes | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONTRE E. | | | | |
| 89927 | <i>Cephalanthera pallens</i> (Sw.) Rich., 1818 | Céphalanthère à grandes fleurs, Heiböhrche blanche | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79) | | | | |
| 93097 | <i>Crepis nicaeensis</i> Bab., 1807 | Crépide de Nice | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79) | | | | |
| 94169 | <i>Cytisus suppinus</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |

Phanérogames

362

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effet inférieur estimé | Effet supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| 96001 | <i>Elymus europaeus</i> L., 1767 | Orge des bois, Hordélyme d'Europe | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BIGET P. | | | | |
| 100149 | <i>Geranium sanguineum</i> L., 1753 | Géranium sanguin, Herbe à becquet, Bec de grue, | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | Faible | 10 | | |
| 105261 | <i>Lathyrus sphaericus</i> Reitz., 1783 | Gesse à fruits ronds, Gesse à graines rondes | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79) | | | | |
| 105748 | <i>Lepturus cylindricus</i> (Willd.) Tim., 1920 | Lepture cylindrique | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79) | | | | |
| 106291 | <i>Linum catharticum</i> L., 1753 | Lin | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79) | | | | |
| 110920 | <i>Orchis militaris</i> L., 1753 | Casque militaire, Orchis casqué | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79) | | | | |
| 112839 | <i>Pucedanum peucedanum</i> L., 1762 | Pucedan d'Alsace | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79) | | | | |
| 117049 | <i>Ranunculus ranunculus</i> L., 1753 | Renouée, Renouée à feuilles de graminée | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONTRE E. | | | | |
| 121958 | <i>Scorzonera scorzonera</i> L., 1771 | Feuilles poilées, Scorzonère hirsute | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONTRE E. | | | | |
| 121959 | <i>Scorzonera scorzonera</i> L., 1753 | Scozonère d'Espagne, Salsifis noir, Asperge d'hiver | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | Faible | 72 | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effet inférieur estimé | Effet supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| 123032 | <i>Sesell libanotis</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824 | Libanotis | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79) | | | | |
| 124740 | <i>Stachys alpina</i> L., 1753 | Epiaire des Alpes | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | Faible | | | |
| 126159 | <i>Thalictrum minus</i> L., 1753 | Petit pigamon, Pigamon mineur, | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |

7.2 Espèces autres

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effet inférieur estimé | Effet supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| 39019 | <i>Aspidella echinocephala</i> (Vitt.) Gilbertson | Amanite épineuse | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79) | | | | |
| 29387 | <i>Boletus dupainii</i> Boudier | Bolet de dupain | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79) | | | | |
| 29396 | <i>Boletus fechtneri</i> Velenovskiy | Bolet pâle | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79) | | | | |
| 34643 | <i>Corinaeus arcuatorum</i> R. Henry | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79) | | | | |
| 35802 | <i>Corinaeus volvatus sensu Moser</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79) | | | | |
| 30401 | <i>Hygophorus glycyphorus</i> Fr. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79) | | | | |



HAUTE VALLEE DE LA BOUTONNE (Identifiant national : 540120129)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 08950000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : J.TERRISSE (LPO), - 540120129, HAUTE VALLEE DE LA BOUTONNE. - INPN, SPN- MNHN Paris, 11P. <https://mnhn.mnhn.fr/zone/znief/540120129.pdf>

Région en charge de la zone : Poitou-Charentes

Rédacteur(s) : J.TERRISSE (LPO)

Centroïde calculé : 405027°-2129724°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN :

Date actuelle d'avis CSRPN :

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 18/06/2014

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 4 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 7 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 10 |
| 9. SOURCES | 11 |

290

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Charente-Maritime
- Département : Deux-Sèvres
- Commune : Saligné (INSEE : 79312)
- Commune : Bataille (INSEE : 79027)
- Commune : Brieuil-sur-Chizé (INSEE : 79065)
- Commune : Secondigné-sur-Belle (INSEE : 79310)
- Commune : Celles-sur-Belle (INSEE : 79061)
- Commune : Mazères-sur-Béronne (INSEE : 79173)
- Commune : Saint-Romans-lès-Melle (INSEE : 79295)
- Commune : Fontenille-Saint-Martin-d'Entragues (INSEE : 79122)
- Commune : Chef-Boutonne (INSEE : 79083)
- Commune : Chizé (INSEE : 79090)
- Commune : Brioux-sur-Boutonne (INSEE : 79057)
- Commune : Périgné (INSEE : 79204)
- Commune : Villiers-sur-Chizé (INSEE : 79352)
- Commune : Luché-sur-Brioux (INSEE : 79158)
- Commune : Lusseray (INSEE : 79160)
- Commune : Vernoux-sur-Boutonne (INSEE : 79343)
- Commune : Vert (INSEE : 79346)
- Commune : Paizay-le-Tort (INSEE : 79199)
- Commune : Dampierre-sur-Boutonne (INSEE : 17138)
- Commune : Ensigné (INSEE : 79111)
- Commune : Chérigné (INSEE : 79085)
- Commune : Villefollet (INSEE : 79348)
- Commune : Saint-Séverin-sur-Boutonne (INSEE : 17401)
- Commune : Asnières-en-Poitou (INSEE : 79015)
- Commune : Gournay-Loizé (INSEE : 79136)
- Commune : Juillé (INSEE : 79142)

1.2 Superficie

5166,43 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 37
 Maximale (mètre): 85

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Ensemble du réseau hydrographique primaire et secondaire de la haute vallée de la Boutonne et de plusieurs de ses affluents (bassin de la Charente) : ruisseaux et petites rivières de plaine, à eaux courantes, de qualité encore correcte malgré les mutations récentes des pratiques agricoles sur l'ensemble du bassin versant, à lit majeur constitué d'une mosaïque de prairies naturelles humides, de ripisylve discontinue en cours de remplacement par les cultures céréalières et la poppiculture.

INTERET FAUNISTIQUE :

Ensemble remarquable par la présence de tout un cortège d'espaces menacés inféodés aux cours d'eau planitiaires possédant des eaux de bonne qualité : Loutre, Invertébrés tels que la Rosalie des Alpes ou le Cuvré des marais, poissons, amphibiens, etc.

Comme tous les écosystèmes aquatiques de plaine, le réseau hydrographique de la Boutonne est particulièrement sensible aux différentes menaces susceptibles d'altérer la qualité physico-chimique de ses eaux auxquelles de nombreuses espèces remarquables sont étroitement associées :

- soit directes : par pollution localisée (effluents domestiques ou agricoles en provenance de villages non équipés de stations d'épuration) ou diffuse (eutrophisation provoquée par les intrants agricoles en provenance du bassin versant), par modification du régime hydraulique et thermique (impact des prélèvements pour l'irrigation sur les débits d'étiage et les températures maximales),

- soit indirectes : par artificialisation des milieux riverains (disparition de la ripisylve, remplacement des prairies humides par des cultures céréalières) ou du bassin versant dans son entier (intensification agricole).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Pêche
- Chasse
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|--------------|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Faunistique - Poissons - Amphibiens - Oiseaux - Mammifères - Autre Faune (préciser) - Insectes - Floristique - Phanérogames | | |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les contours de la ZNIEFF II se calent sur le périmètre du site NATURA 2000 FR5400447 "VALLEE DE LA BOUTONNE" : unité fonctionnelle constituée par le réseau hydraulique primaire et secondaire de la haute vallée de la Boutonne ; le lit majeur est pris en compte en raison de son rôle dans le cycle biologique de plusieurs espèces patrimoniales (insectes, amphibiens, espèces végétales).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Pollutions et nuisances | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Modification du fonctionnement hydraulique | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pratiques agricoles et pastorales | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pratiques et travaux forestiers | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nullie | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Bryophytes - Lichens - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Autre Faunes - Mammifères - Phanérogames - Lépidoptères - Coléoptères | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux | <ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Poissons |

5.2 Habitats

| |
|--------------------|
| 6. HABITATS |
|--------------------|

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 24 <i>Eaux courantes</i> | | | | |
| | 44.3 <i>Forêt de Fîennes et d'Autres des fleuves médio-européens</i> | | | | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 82 <i>Cultures</i> | | | | |
| | 37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i> | | | | |
| | 83.321 <i>Plantations de Peupliers</i> | | | | |

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPÈCES

7.1 Espèces déterminantes

| Code (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effetif inférieur estimé | Effetif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 267 | <i>Bufo calamita</i> (Laurin, 1768) | Crapaud calamite | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DIREN POITOU-CHARENTES | | | | |
| 281 | <i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758) | Ranette verte | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DIREN POITOU-CHARENTES | | | | |
| 12348 | <i>Rosalia alpina</i> (Linnaeus, 1758) | Rosalie des Alpes | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DIREN POITOU-CHARENTES | | | | |
| 18437 | <i>Austropotamobius pallipes</i> (L.), Ecrivain à pieds blancs (L.), Ecrivain à pattes blanches (L.), Ecrivain pallipède (L.) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DIREN POITOU-CHARENTES | | | | |
| 53979 | <i>Lycena dispar</i> (L.), Grand Cuivre (L.), Grand Cuivre salin (L.), Argus (L.), Lyçène noirs (L.), Lyçène dispar (L.), Cuivre de la Parle-d'eau (L.) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DIREN POITOU-CHARENTES | | | | |
| 61258 | <i>Arvicola sapidus</i> Miller, 1908 | Camagnol amphibie, Rat d'eau | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DIREN POITOU-CHARENTES | | | | |
| 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre | Reproduction indéterminée | Bibliographie : DIREN POITOU-CHARENTES | Faible | | | |

7.2 Espèces autres

| Code (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effetif inférieur estimé | Effetif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 4151 | <i>Cetta cetti</i> (Temminck, 1820) | Bouscarle de Cetti | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DIREN POITOU-CHARENTES | | | | |
| 2679 | <i>Falco subturo</i> (Linnaeus, 1758) | Falco hobereau | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DIREN POITOU-CHARENTES | | | | |
| 3755 | <i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771 | Bergeronnette des ruisseaux | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DIREN POITOU-CHARENTES | | | | |
| 88893 | <i>Carex strigosa</i> Huds., 1778 | Lathe à épis gris, Lathe à | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DIREN POITOU-CHARENTES | | | | |
| 104337 | <i>Juncus stratus</i> Schousb. ex E. Mey., 1822 | Jonc stie | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DIREN POITOU-CHARENTES | | | | |
| 117146 | <i>Ranunculus ophiogetonifolius</i> Vill., 1789 | Bouton d'or à feuilles d'Ophiogeton, Ranoncle d'Ophiogeton | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DIREN POITOU-CHARENTES | | | | |
| 69182 | <i>Cottus gobio</i> (Linnaeus, 1758) | Chabot, Chabot commun | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DIREN POITOU-CHARENTES | | | | |
| 67606 | <i>Esox lucius</i> (Linnaeus, 1758) | Brochet | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DIREN POITOU-CHARENTES | | | | |
| 66333 | <i>Lampetra planeri</i> (Bloch, 1784) | Lampre de Planer, Lampre de rivière, Petite Lampre de ruisseau européenne | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DIREN POITOU-CHARENTES | | | | |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|----------------------|--|-------------------------|---|
| Amphibiens | 281 | <i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Crustacés | 18437 | <i>Austropotamobius pallipes</i> (Lereboullet, 1858) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Protection des écrivains autochtones sur le territoire français métropolitain (lien) |
| Insectés | 12348 | <i>Rosalia alpina</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des insectés protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Insectés | 53979 | <i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des insectés protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Mammifères | 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Oiseaux | 2679 | <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Oiseaux | 3755 | <i>Molucalla cinerea</i> Tunstall, 1771 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Oiseaux | 4151 | <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Poissons | 66333 | <i>Lampetra planeri</i> (Bloch, 1764) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien) |
| | | | | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien) |
| Poissons | 67606 | <i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien) |
| | | | | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien) |
| Poissons | 68182 | <i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien) |
| Angiospermes | 117146 | <i>Ranunculus ophiogeton</i> Vill., 1789 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

Non renseigné

193

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|------------------------|----------------------|--|
| Bibliographie | DIREN POITOU-CHARENTES | 1998 | Bordereau scientifique du site NATURA 2000 FR3400447 "vallée de la Boutonne" |

199



znief
Système National de
Zones Naturelles
Sensibles



Date d'édition : 06/07/2018
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/540003301>

COMMUNAL DE PERIGNE (Identifiant national : 540003301)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 08950705)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : JEAN TERRISSE (LPO), - 540003301, COMMUNAL DE PERIGNE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 16P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/540003301.pdf>

Région en charge de la zone : Poitou-Charentes
Rédacteur(s) : JEAN TERRISSE (LPO)
Centre/ide calculé : 398281°-2136075°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 06/04/2001
Date actuelle d'avis CSRPN : 06/04/2001
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 18/06/2014

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 3 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 15 |
| 9. SOURCES | 16 |

200



Date d'édition : 06/07/2018
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/540003301>

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Deux-Sèvres
- Commune : Périgné (INSEE : 79204)

1.2 Superficie

14,18 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 46
Maximale (mètre): 47

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Prairies hygrophiles oligotrophes ; étang à niveau variable.

INTERET BOTANIQUE :

Autrefois exceptionnel, aujourd'hui fortement réduit en surface avec la transformation quasi totale des prairies naturelles en cultures intensives de maïs. La ZNIEFF est néanmoins maintenue en raison à la fois de la grande richesse floristique des lambeaux relictuels du MOLINION et pour son intérêt historique (échantillon témoin de groupements végétaux très originaux, en voie d'extinction dans les rares sites régionaux encore connus).

Le plan d'eau de la base de loisirs contiguë est inclus en raison de ses fortes populations de Gratiola officinale (Gratiola officinalis) - espèce protégée au niveau national -, bien qu'il subisse des pressions assez fortes : piétinement des pêcheurs, introduction de Nymphaea exotiques, "entretien" de la végétation etc..

Site très relictuel, dont 13 des 20 espaces végétaux déterminantes d'origine ont irrémédiablement disparu.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

Fonctionnels

- Historique

Complémentaires

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Périmètre très fortement réduit par suite de la transformation quasi totale du communal en cultures céréalières intensives (maïs). La zone se restreint désormais à une bande de prairie hygrophile de 200m X 40m à laquelle on a ajouté l'étang de la zone de loisirs en contact immédiat (station de Gratiolle), Le Bois Rault, distant de quelque 500m a aussi été inclus en raison de son intérêt ornithologique (héronnière).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Equipements sportifs et de loisirs | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Nuisances liées à la surfréquentation, au piétement | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Mise en eau, submersion, création de plan d'eau | Intérieur | Indéterminé | Réel |

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Actions sur la végétation immergée, flottante ou amphibie, y compris fauchage et démolage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Traitements de fertilisation et pesticides | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Sports et loisirs de plein-air | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pêche | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Introductions | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Null | Faible | Moyen | Bon |
|---|--------------|-----------|-----------------------------------|
| - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Lichens - Mammifères - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | - Bryophytes | - Oiseaux | - Phanérogames - Ptéridophytes |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 22.3 Communautés amphibes | | | | |
| | 37.3 Prairies humides oligotrophes | | | | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 53.1 Roselières | | | | |
| | 22.4 Végétations aquatiques | | | | |
| | 22.13 Eaux eutrophes | | | | |
| | 44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens | | | | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 82.1 Champs d'un seul tenant inondés ou cultivés | | | | |
| | 83.32 Plantations d'arbres feuillus | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

202

7. ESPÈCES

7.1 Espèces déterminantes

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effet inférieur estimé | Effet supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Héron cendré | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN-MARIE BOUTIN | | | | |
| 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | Milieu noir | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN-MARIE BOUTIN | | | | |
| 83197 | <i>Apium inundatum</i> (L.) Rchb.f., 1867 | Ache inondée, Cèlén inondé | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | 1982 - 1991 |
| 84675 | <i>Aster linosyris</i> (L.) Bernh., 1800 | <i>Linosyris</i> , <i>Linosyris</i> à feuilles de Lin | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| 88866 | <i>Carex serotina</i> Mèrel, 1821 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | Faible | | | |
| 93456 | <i>Crypsis</i> <i>alopécuroides</i> (Pflger & Mitterp.) Schrad., 1806 | <i>Crypside</i> faux vulpin, <i>Crypsis</i> faux vulpin | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| 94633 | <i>Deschampsia media</i> (Gouan) Roem. & Schult., 1817 | Canche à feuilles de jonc, Canche moyenne | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | Faible | 2 | | |
| 98977 | <i>Fritillaria meleagris</i> L., 1753 | <i>Fritillaire</i> damier, <i>Fritillaire</i> plâtée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79) | | | | |
| 99390 | <i>Galium boreale</i> L., 1753 | Galliet boreal | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |

Phanérogames

Oiseaux

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effet inférieur estimé | Effet supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| 99410 | <i>Galium debile</i> Desv., 1818 | Galliet debile, Galliet chéiff | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | Moyen | 1000 | | |
| 100576 | <i>Galbia officinalis</i> L., 1753 | Gratie officinale, Herbe au pauvre homme | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | Moyen | 1000 | | |
| 103598 | <i>Inula britannica</i> L., 1753 | Inule des fleuves, Inule d'Angleterre, Inule de Grande-Bretagne | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| 104337 | <i>Juncus stratus</i> Schousb. ex E.Mey., 1822 | Jonc strié | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | Faible | 10 | | |
| 105241 | <i>Lathyrus pannonicus</i> (Jacq.) Garcke, 1863 | Gesse de Pannonie | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| 110885 | <i>Orchis inamata</i> L., 1753 | <i>Orchis inamata</i> , Orchis couleur de chair | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79) | | | | |
| 110899 | <i>Orchis laxiflora</i> Lam., 1779 | Orchis à fleurs lâches | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | Faible | | | |
| 110920 | <i>Orchis militaris</i> L., 1753 | Orchis militaire, Casque militaire, Orchis casque | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| 116405 | <i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn., 1791 | Herbe de Saint-Roch, Pulicaire annuelle, Pulicaire commune | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| 117146 | <i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789 | Bouton d'or, Ranuncule d'Ophioglosse, Ranuncule à feuilles d'Ophioglosse | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effet inférieur estimé | Effet supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------|---|--|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| 126034 | <i>Teucrium scordium</i> L., 1753 | Gemandée des marais, Chamaraz, Gemandée d'eau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | Moyen | | | |
| 127379 | <i>Trifolium maritimum</i> Hudt., 1762 | Trèfle écailleux | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| 128314 | <i>Utricularia major sensu Utricularia citrina</i> , Grande utriculaire | Utrriculaire élevée, Utrriculaire élevée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| 128793 | <i>Veronica anagalloides</i> Guss., 1826 | Veronique faux-mouron-d'eau, Veronique faux-Mouron | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| 129660 | <i>Viola pumila</i> Chaix, 1785 | Petite violette, Violette naïve | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |

7.2 Espèces autres

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effet inférieur estimé | Effet supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------|---|------------------------------|---|---|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| 5520 | <i>Drepanocladus sendtneri</i> (Schimp. ex H.Müll.) Wernst. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79) | | | | |
| 2895 | <i>Acropter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | Epervier d'Europe | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : JEAN-MARIE BOUTIN | | | | |
| 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | Busard Saint-Martin | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : JEAN-MARIE BOUTIN | | | | |
| 2543 | <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758) | Bécassine des marais | Passage, migration | Informateur : JEAN-MARIE BOUTIN | | | | |



Date création : 06/07/2018
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120052>

LA CHAGNEE (Identifiant national : 540120052)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000823)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : YVES BARON, - 540120052, LA CHAGNEE.- INPN, SPN-MNHN Paris, 10P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120052.pdf>

Région en charge de la zone : Poitou-Charentes
 Rédacteur(s) : YVES BARON
 Centre/ré calculé : 396112°-2135553°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 10/07/2001
 Date actuelle d'avis CSRPN : 10/07/2001
 Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
 Date de dernière diffusion INPN : 18/06/2014

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 3 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 4 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 10 |
| 9. SOURCES | 10 |

204



1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Deux-Sèvres
- Commune : Brulain (INSEE : 79058)

1.2 Superficie

,79 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 49
 Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Prairie méso-hygrophile

INTERET BOTANIQUE :

Une des deux dernières stations d'Orchis punaise (Orchis coriophora) en Poitou-Charentes (avec Ambernac, 16). Orchidée en très fort déclin partout en France et protégée au niveau national. En sa compagnie, quelques autres espèces intéressantes : Ophrys apifera, dont var. bicolor, Ophrys sphégoles, Anacamptis pyramidalis, Himantoglossum hircinum et Gallium boreale (rare dans la région, hors ce secteur sud des Deux-Sèvres).

Une gestion conservatoire de ce pré humide pâturé est envisagée par le groupement régional de la Société Française d'Orchidophilie (SFO) en accord avec le propriétaire.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Ecologique
- Floristique
- Phanérogames

Fonctionnels

- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales

Complémentaires

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Limites du pré.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Suppression ou entretien de végétation | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Null | Faible | Moyen | Bon |
|------|--------|-------|----------------|
| | | | - Phanérogames |

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Oiseaux
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fongés

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 38.1 | | | | |
| | Pâtures mésophiles | | | | |

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 84.4 | | | | |
| | Bocages | | | | |
| | 38.2 | | | | |
| | Prairies de fauche de basse altitude | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 82.2 Cultures avec marges de végétation spontanée | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPÈCES

7.1 Espèces déterminantes

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Degré d'abondance | Effetif inférieur estimé | Effetif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 99390 | <i>Galium boreale</i> L., 1753 | Galiet boreal | Reproduction certaine ou probable | Faible | | | 1994 |
| 110834 | <i>Orchis corophora</i> L., 1753 | Orchis à odeur de punaise | Reproduction certaine ou probable | | 50 | | 1994 - 2000 |
| 127429 | <i>Trifolium patens</i> Schreb., 1804 | Trèfle étalé | Reproduction certaine ou probable | Faible | | | |

7.2 Espèces autres

| Code (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effetif inférieur estimé | Effetif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 82288 | <i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817 | <i>Orchis pyramidalis</i> en pyramide | Reproduction certaine ou probable | Informateur Y.BARON | | | | |
| 82922 | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753 | Flouve odorante | Reproduction certaine ou probable | Informateur Y.BARON | | | | |
| 86087 | <i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762 | Chlore perfoliée | Reproduction certaine ou probable | Informateur Y.BARON | | | | |
| 86490 | <i>Briza media</i> L., 1753 | Brze intermédiaire | Reproduction certaine ou probable | Informateur Y.BARON | | | | |

902

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effetif inférieur estimé | Effetif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 120685 | <i>Salvia pratensis</i> L., 1753 | Sauge des prés, Sauge commune | Reproduction certaine ou probable | Informateur Y.BARON | | | | |
| 116952 | <i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753 | Renoncule bulbeuse | Reproduction certaine ou probable | Informateur Y.BARON | | | | |
| 116903 | <i>Ranunculus acris</i> L., 1753 | Bouton d'or, Renoncule âcre | Reproduction certaine ou probable | Informateur Y.BARON | | | | |
| 115918 | <i>Primula veris</i> L., 1753 | Coucou, Primevère officinale, Bréville | Reproduction certaine ou probable | Informateur Y.BARON | | | | |
| 114416 | <i>Poa trivialis</i> L., 1753 | Pâurin commun, Gazon d'Angleterre | Reproduction certaine ou probable | Informateur Y.BARON | | | | |
| 113906 | <i>Plantago media</i> L., 1753 | Plantain moyen | Reproduction certaine ou probable | Informateur Y.BARON | | | | |
| 111369 | <i>Omithogalum pyrenaicum</i> L., 1753 | Omithogale des Pyrénées | Reproduction certaine ou probable | Informateur Y.BARON | | | | |
| 110477 | <i>Ophrys sphegodes</i> Mill., 1768 | Ophrys abeille | Reproduction certaine ou probable | Informateur Y.BARON | | | | |
| 110468 | <i>Ophrys scolopax</i> Cav., 1793 | Ophrys bécasse | Reproduction certaine ou probable | Informateur Y.BARON | | | | |
| 110335 | <i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762 | Ophrys abeille | Reproduction certaine ou probable | Informateur Y.BARON | | | | |
| 106653 | <i>Lotus corniculatus</i> L., 1753 | Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée | Reproduction certaine ou probable | Informateur Y.BARON | | | | |

Date d'édition : 06/07/2019
<https://pnr.mnh.fr/zoo/zniff/#/540120052>



| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effetif inférieur estimé | Effetif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 105817 | <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779 | Marguerite commune, Leucanthème | Reproduction certaine ou probable | Informateur Y.BARON | | | | |
| 105247 | <i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753 | Gesse des prés | Reproduction certaine ou probable | Informateur Y.BARON | | | | |
| 105162 | <i>Lathyrus aphaca</i> L., 1753 | Gesse sans feuilles | Reproduction certaine ou probable | Informateur Y.BARON | | | | |
| 102797 | <i>Himantoglossum hircium</i> (L.) Spreng., 1826 | Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc | Reproduction certaine ou probable | Informateur Y.BARON | | | | |
| 99683 | <i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P.Beauv., 1812 | Gaudinie fragile | Reproduction certaine ou probable | Informateur Y.BARON | | | | |
| 99582 | <i>Galium verum</i> L., 1753 | Gallet jaune, Caille-jail jaune | Reproduction certaine ou probable | Informateur Y.BARON | | | | |
| 93860 | <i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753 | Crétole | Reproduction certaine ou probable | Informateur Y.BARON | | | | |
| 92127 | <i>Colchicum autumnale</i> L., 1753 | Colchique d'automne, Safran des prés | Reproduction certaine ou probable | Informateur Y.BARON | | | | |
| 91422 | <i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All., 1785 | Cirse bulbeux | Reproduction certaine ou probable | Informateur Y.BARON | | | | |
| 91274 | <i>Cirsium acule</i> Scop., 1769 | Cirse sans tige | Reproduction certaine ou probable | Informateur Y.BARON | | | | |
| 86601 | <i>Bromus erectus</i> Huds., 1762 | Brome érigé | Reproduction certaine ou probable | Informateur Y.BARON | | | | |

Date d'édition : 06/07/2019
<https://pnr.mnh.fr/zoo/zniff/#/540120052>



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 123367 | <i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell., 1915 | Silaüs des prés, Cumin des prés | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 127439 | <i>Trifolium pratense</i> L., 1753 | Tréfle des prés, Tréfle violet | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |
| | 127660 | <i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812 | Triséte commune, Avoine dorée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Y.BARON | | | | |

7.3 Espèces à statut réglementé
Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|---|---------|-----------------------------------|------------------------|
| 99390 <i>Galium boreale</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur Y.BARON |
| 110834 <i>Orchis corniculata</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur B.RAGOT |
| 127429 <i>Trifolium pratense</i> Schreb., 1804 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur Y.BARON |

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|---------|----------------------|-------|
| Informateur | B.RAGOT | | |
| | Y.BARON | | |

208



Prairies humides des Bouasses (Identifiant national : 540015616)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 08950725)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : JEAN TERRISSE (LPO), Nicolas COTREL (Deux-Sèvres Nature Environnement, 2017), - 540015616, Prairies humides des Bouasses. - INPN, SPN-MNHN Paris, 17P. <https://npn.mnhn.fr/zone/znief/540015616.pdf>

Région en charge de la zone : Poitou-Charentes
 Rédacteur(s) : JEAN TERRISSE (LPO), Nicolas COTREL (Deux-Sèvres Nature Environnement, 2017)
 Centroïde calculé : 398982°-2130220°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 14/03/2002
 Date actuelle d'avis CSRPN : 10/04/2019
 Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
 Date de dernière diffusion INPN : 05/01/2021

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 7 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 17 |
| 9. SOURCES | 17 |

209

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Deux-Sèvres
- Commune : Saligné (INSEE : 79312)
- Commune : Vernoux-sur-Boutonne (INSEE : 79343)

1.2 Superficie

89,58 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 46
 Maximale (mètre): 50

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Prairies méso-à hygrophiles sur sol argilo-calcaire à alternance de phases d'engorgement et de dessiccation. Cette ZNIEFF est centrée sur le Communal de Bouasses (Saligné) et a été étendue au nord-nord-ouest pour rejoindre la Boutonne via les prairies de la Parque aux Vaux, ensemble récemment intégré dans la ZSC de la Vallée de la Boutonne.

INTERET BOTANIQUE :

Malgré la superficie réduite du site et son caractère très relictuel (les environs sont entièrement dévolus à la culture du maïs irrigué), présence de prairie calcicole oligotrophe à Sanguisorbe officinale (*Sanguisorba officinalis*).

Site très menacé - comme tous les milieux de ce type en Poitou-Charentes - par l'extension de la maïsiculture irriguée.

INTERET HERPETOLOGIQUE :

Site de reproduction encore bien fonctionnel pour plusieurs espèces patrimoniales bocagères dont le Triton crélé, le Triton marbré ou la Rainette arboricole.

INTERET ENTOMOLOGIQUE :

Présence du Cuivré des marais (*Lycaena dispar*) et de plusieurs espèces d'Odonates, en particulier le Leste des bois (*Lestes dryas*).

Présence de plusieurs orthoptères déterminants liés aux zones humides inondables dont le Criquet ensanglanté (*Stethophyma grossum*) et le Criquet des roseaux (*Mecostethus parapterurus*) en beaux effectifs.

INTERET AVIFAUNISTIQUE

En période de reproduction, les haies du site accueillent la Pie-grièche écorcheur, alors que les parcelles cultivées peuvent être utilisées par l'Oedicnème criard lors d'années relativement sèches. La Rousserole effarvante est également présente au sein des roselières.

INTERET MAMMALOGIQUE

Présence de la Loutre sur le site. Des inventaires plus poussés sont à mener pour caractériser la présence de Chiroptères ainsi que d'autres mammifères semi-aquatiques patrimoniaux.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--------------|--------------|-----------------|
|--------------|--------------|-----------------|

- Orthoptères
- Habitats
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Mammifères
- Odonates
- Lépidoptères
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Importantes modifications de contours depuis 1992 : exclusion d'une parcelle cultivée en maïs, d'une autre en prairie artificielle et de plusieurs prairies mésophiles. Le site se limite désormais aux prairies hygrophiles à méso-hygrophiles, pâturées ou fauchées, au sein du Communal des Bouasses.

En 2017, les plantations de Peupliers, les prairies temporaires, les cultures, et l'étang de loisir au Nord-Ouest ont été exclus du zonage en raison de l'absence de données d'espèces patrimoniales. L'ajout des prairies mésophiles à hygrophiles dans le périmètre est justifié par la présence du Cuivre des marais, du Criquet des roseaux, du Criquet ensanglanté et de la Courtilière commune, espèces caractéristiques de ces milieux. Ces stations contribuent fortement à la continuité du site avec la vallée de la Boutonne. Les nombreuses mares disjoints dans le zonage accueillent plusieurs espèces d'amphibiens, notamment la Rainette arboricole et le Pélodyte ponctué. La Grenouille rousse est localisée quant à elle dans un boisement naturel en périphérie Nord-Est du site.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Fauchage, fenaison | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nullité | Faible | Moyen | Bon |
|---|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Mollusques - Arachnides - Myriapodes - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Mammifères - Reptiles - Crustacés - Orthoptères | <ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Piéridophytes - Odonates - Lépidoptères | <ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Oiseaux |

5.2 Habitats

| |
|-------------|
| 6. HABITATS |
|-------------|

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| C1.69 Végétations enracinées à feuilles flottantes des plans d'eau temporaires | 22.43 Végétations enracinées flottantes | | Bibliographie : Cotrel N. (Deux-Sèvres Nature Environnement) 2007 Projet : préservation et valorisation de l'intérêt biologique et culturel des prairies communales du Meilais et des Deux-Sèvres | 1 | 2007 - 2007 |
| C3.24 Communautés non-graminoides de moyenne-haute taille barrant l'eau | 53.14 Roselières basses | | Bibliographie : Cotrel N. (Deux-Sèvres Nature Environnement) 2007 Projet : préservation et valorisation de l'intérêt biologique et culturel des prairies communales du Meilais et des Deux-Sèvres | 1 | 2007 - 2007 |
| E3.51 Prairies à Molinia caerulea et communautés apparentées | 37.31 Prairies à Molinia et communautés associées | | Bibliographie : Cotrel N. (Deux-Sèvres Nature Environnement) 2007 Projet : préservation et valorisation de l'intérêt biologique et culturel des prairies communales du Meilais et des Deux-Sèvres | 10 | 2007 - 2007 |

211

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| E3.41 Prairies atlantiques et subatlantiques humides | 37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques | | Bibliographie : Cotrel N. (Deux-Sèvres Nature Environnement) 2007 Projet : préservation et valorisation de l'intérêt biologique et culturel des prairies communales du Meilais et des Deux-Sèvres | 30 | 2007 - 2007 |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| C3.2 Roselières et formations de bordure à grands héliophytes autres que les roseaux | 53.1 Roselières | | | | |
| C3.11 Formations à petits héliophytes des bords des eaux à débit rapide | 53.4 Bordures à Calamagrostis des eaux courantes | | | | |
| FA.2 Haies d'espèces indigènes fortement gérées | 84.2 Bordures de haies | | | | |
| E2.1 Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage | 38.1 Pâturages mésophiles | | | | |
| J5.4 Eaux courantes très artificielles non salées | 89.22 Fossés et petits canaux | | | | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| E2.1 Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage | 38 Prairies mésophiles | | | | |
| E2.61 Prairies améliorées sèches ou humides | 81 Prairies améliorées | | | | |
| I1.1 Monocultures intensives | 82 Cultures | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPÈCES

7.1 Espèces déterminantes

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Degré d'abondance | Effet inférieur estimé | Effet supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------------|
| 281 | <i>Hyia arborea</i> (Linnaeus, 1758) | Ranette verte (La) | Reproduction certaine ou probable | Informateur ; DSNE | | | 2014 - 2017 |
| 252 | <i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803) | Pélodyte ponctué (Le) | Reproduction certaine ou probable | Informateur ; DSNE | 1 | 10 | 2014 - 2016 |
| 351 | <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758 | Grenouille rousse (La) | Reproduction certaine ou probable | Informateur ; DSNE | | | 2014 - 2016 |
| 139 | <i>Triturus cristatus</i> (Laurénil, 1768) | Triton crête (Le) | Reproduction certaine ou probable | Informateur ; Deux-Sèvres Nature Environnement | | | 2014 - 2016 |
| 163 | <i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800) | Triton marbré (Le) | Reproduction certaine ou probable | Informateur ; Deux-Sèvres Nature Environnement | | | 2014 - 2016 |
| 53979 | <i>Lycæna dispar salinè</i> (Le), <i>Grand Argus</i> (Le), <i>Grand Cuivre</i> (Le), <i>oedinemus</i> (Le), <i>Lyçène</i> (Le), <i>Lyçène</i> (Le), <i>dispar</i> (Le), <i>Cuivre</i> de la Parle-d'eau (Le) | | Reproduction certaine ou probable | Informateur ; Deux-Sèvres Nature Environnement | | | 2012 - 2017 |
| 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre | Reproduction indéterminée | Informateur ; DSNE | 1 | 1 | 2013 - 2015 |
| 4195 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | Roussetolle effarvée | Reproduction certaine ou probable | Informateur ; Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres | | | 2012 - 2013 |

7.2 Espèces autres

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Degré d'abondance | Effet inférieur estimé | Effet supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------------|
| 3120 | <i>Buthus oedinemus</i> (Linnaeus, 1758) | Oedémisme crard | Reproduction certaine ou probable | Informateur ; Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres | | | 2016 - 2016 |
| 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | Pie-grièche écorcheur | Reproduction certaine ou probable | Informateur ; Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres | | | 2013 - 2017 |
| 65899 | <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> (Linnaeus, 1758) <i>Courtilière commune</i> , <i>Courtilière</i> , <i>Taupo-Crillon</i> , <i>Perce-chaussée</i> , <i>Taupo</i> , <i>Écrivain de terre</i> , <i>Loup de terre</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur ; Deux-Sèvres Nature Environnement | | | 2014 - 2018 |
| 535849 | <i>Mecostethus papilionus</i> (Hagenbach, 1822) | Craquet des Roseaux | Reproduction certaine ou probable | Informateur ; Deux-Sèvres Nature Environnement | | | 2005 - 2016 |
| 65487 | <i>Stethophyma grossum</i> (Linnaeus, 1758) | Craquet ensanglanté, <i>Édipode</i> ensanglanté | Reproduction certaine ou probable | Informateur ; DSNE | 1 | 100 | 2012 - 2016 |
| 120758 | <i>Sanguisorba officinalis</i> L., 1753 | Grande Sanguisorbe, <i>Pimpinelle officinale</i> , <i>Pimpinelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur ; F.COTREL (Deux Sèvres Nature Environnement) | | | 2014 - 2014 |



PLAINE DE BRIOUX ET DE CHEF-BOUTONNE (Identifiant national : 540014434)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 066500000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : J.M.BOUTIN ; CLEMENT BRAUD (GODS, 2017), - 540014434, PLAINE DE BRIOUX ET DE CHEF-BOUTONNE.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 21P. <https://mnh.mnhn.fr/zone/znieff/540014434.pdf>

Région en charge de la zone : Poitou-Charentes
Rédacteur(s) : J.M.BOUTIN ; CLEMENT BRAUD (GODS, 2017)
Centriféde calculé : 410786°-2124081°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN :
Date actuelle d'avis CSRPN : 26/11/2019
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 05/01/2021

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 4 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 7 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 21 |
| 9. SOURCES | 21 |

213

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Deux-Sèvres
- Département : Charente
- Commune : Valdejaume (INSEE : 79140)
- Commune : Couture-d'Argenson (INSEE : 79106)
- Commune : Allonnay (INSEE : 79136)
- Commune : Paizay-Naudouin-Embourie (INSEE : 16253)
- Commune : Fontenille-Saint-Martin-d'Entraigues (INSEE : 79122)
- Commune : Villemain (INSEE : 79349)
- Commune : Chef-Boutonne (INSEE : 79083)
- Commune : Theil-Rabier (INSEE : 16381)
- Commune : Melleran (INSEE : 79175)
- Commune : Brioux-sur-Boutonne (INSEE : 79057)
- Commune : Luché-sur-Brioux (INSEE : 79158)
- Commune : Lusseray (INSEE : 79160)
- Commune : Fontvillie (INSEE : 79064)
- Commune : Chérigné (INSEE : 79085)
- Commune : Melle (INSEE : 79174)
- Commune : Loubillé (INSEE : 79154)
- Commune : Paizay-le-Chapt (INSEE : 79198)
- Commune : Asnières-en-Poitou (INSEE : 79015)
- Commune : Loubigné (INSEE : 79153)
- Commune : Aubigné (INSEE : 79018)

1.2 Superficie

20991,43 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 69
Maximale (mètre): 165

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 540015663 - LES PRES THOMAS ET COTEAU DE VILLEMANAN (Type 1) (Id reg. : 066506662)
- Id nat. : 540004672 - FORET DAULNAY (Type 1) (Id reg. : 05990358)
- Id nat. : 540120129 - HAUTE VALLEE DE LA BOUTONNE (Type 2) (Id reg. : 089500000)

1.5 Commentaire général

Plaine agricole à vocation principalement céréalière, même si quelques prairies témoignent toutefois de l'ancienne activité d'élevage, notamment dans les vallées de la Boutonne et de l'Aume. On note également çà et là quelques secteurs plus bocagers encore bien conservés. La zone est parsemée de bosquets et de villages traditionnels à murs de pierre calcaire.

INTERET ORNITHOLOGIQUE :

Remarquable cortège nicheur d'oiseaux de plaines agricoles : Outarde canepetière, Oedicnème criard, Busard cendré etc..

Importants effectifs hivernants de Vanneau huppé et Pluvier doré.

Présence du Courlis cendré nicheur dans quelques prairies humides (espèce en voie de disparition en Poitou-Charentes).

Nidification du Hibou petit-duc dans plusieurs villages.

La population d'Outarde - pour laquelle la ZNIEFF avait été désignée en 1995 - a connu un déclin dramatique au cours des 10 dernières années passant de 37 mâles chanteurs durant la période de recensement 1991-1995 à 8 seulement en 2003 : l'intensification de l'agriculture par la disparition de l'élevage et des luzernières associées, l'agrandissement du parcelaire, la raréfaction des ressources alimentaires (orthoptères) et la destruction des nids par la mécanisation, semble être la cause essentielle de cette régression observée dans tous les noyaux de population du Centre-Ouest. Depuis cette date, la mise en œuvre de mesures de conservation, essentiellement des mesures agro-environnementales, a permis le maintien d'une population estimée entre 6 et 8 mâles chanteurs en 2017 (GODS, 2018).

INTERET BOTANIQUE :

Le site des prés Thomas et des Coteaux de Villemanan (ZNIEFF 540015668), inclut dans cette ZNIEFF de type 2, se caractérise par deux grands types de milieux : prairies humides sur argile et graviers alluvionnaires en fond de vallon et pelouse-friche mésoxérophile sur les argiles du coteau. Riche cortège d'orchidés dont l'Ophrys jaune (*Ophrys lutea*, PR), et d'espèces thermophiles à affinités méditerranéenne dont la Scorzonère hirsute (*Scorzonera hirsuta*, PR). En fond de vallon, nombreuses espèces des prairies alcalines paratourbeuses avec le Galliet boréal (*Galium boreale*, PR), l'Orchis élevée (*Dactylorhiza elata*, PR).

En outre, le reste de la ZNIEFF à matrice agricole présente une richesse en espèces messicoles remarquables avec plusieurs espèces fortement menacées : la Nigelle de France (*Nigella hispanica*), protégée nationale et en danger critique d'extinction (CR) en Poitou-Charentes, redécouverte en 2018, le Galliet à trois cornes (*Galium tricornutum*), en danger (EN) en Poitou-Charente, L'Odonitte de Jaubert (*Odonites jaubertianus*, PN) est également présent sur certaines friches.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone bénéficiant de mesures agro-environnementales
- Zone bénéficiant d'autres mesures agro-environnementales

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Habitats
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Odonates
- Lépidoptères
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF est basée sur le périmètre de 1995, incluant la totalité de la zone de présence de l'Outarde canepetière. Deux extensions ont été réalisées en 2017, l'une au nord-est sur les communes de Hanc, Meilleran et Gourmay-Loizé, afin d'inclure une colonie de reproduction de Busard centrée ainsi que plusieurs sites à Pie-grèche écorcheur ; l'autre, à l'ouest, sur les communes de Asnières-en-Poitou, Villefollet, Ensigné, Juillé, Villiers-sur-Chizé et Brieuil-sur-Chizé, permettant d'inclure une autre colonie de Busard centrée, plusieurs zones à Pie-grèche écorcheur ainsi que le noyau occidental de reproduction de l'Outarde canepetière.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|-----------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Pratiques agricoles et pastorales | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nullé | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|----------------|-----------|
| - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Ptéridophytes - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | - Amphibiens - Mammifères - Reptiles - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères | - Phanérogames | - Oiseaux |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|--|----------------------------------|--|-------------|-------------|
| E3.4 Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuses | 37 Prairies humides et mégaphorbiaies | | Informateur : JM.BOUTIN (Sans Organisme) | 5 | 2001 - 2001 |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|--|----------------------------------|--|-------------|-------------|
| I1.1 Monocultures intensives | 82.1 Champs d'un seul tenant intensément cultivés | | Informateur : JM.BOUTIN (Sans Organisme) | 60 | 2001 - 2001 |
| J1.2 Bâtimens résidentiels des villages et des périphéries urbaines | 86.2 Villages | | Informateur : JM.BOUTIN (Sans Organisme) | | 2001 - 2001 |
| X07 Cultures intensives permises de bandes de végétation naturelle et/ou semi-naturelle | 82.2 Cultures avec marges de végétation spontanée | | Informateur : JM.BOUTIN (Sans Organisme) | 30 | 2001 - 2001 |

215

| Code CD_NOM | Code Espèce | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|-------------------------------|--|--|---------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 53865 | <i>Euphydryas aurinia</i> | (Fotlenburg, 1775) <i>Artemis</i> (L.), <i>Damier des marais</i> (Le), <i>Mélieuse de la Scabieuse</i> (La), <i>Damier</i> (La) | <i>Artemis</i> (L.), <i>Damier des marais</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : DSNE | Fort | 1 | 20 | 2005 - 2017 |
| 54075 | <i>Glaucopteryx aëlis</i> | (Foda, 1761) <i>Azures des Cytises</i> (L.) | <i>Azures des Cytises</i> (L.) | Reproduction indéterminée | Informateur : DSNE | Moyen | 1 | 20 | 2011 - 2017 |
| 53979 | <i>Lycæna dispar</i> | (Haworth, 1802) <i>Cuirve des marais</i> (Le), <i>Grand Cuirve</i> (Le), <i>Grand Argus satiné</i> (Le), <i>Argus noirs</i> (Le), <i>Lycène disparate</i> (Le), <i>Cuirve de la Parelle-d'eau</i> (Le) | <i>Cuirve des marais</i> (Le), <i>Grand Cuirve</i> (Le), <i>Grand Argus satiné</i> (Le), <i>Argus noirs</i> (Le), <i>Lycène disparate</i> (Le), <i>Cuirve de la Parelle-d'eau</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : DSNE | Fort | 1 | 6 | 2011 - 2015 |
| 53364 | <i>Minois dryas</i> | (Scopoli, 1763) <i>Grand Nègre Dryade</i> (La) | <i>Grand Nègre Dryade</i> (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : DSNE | Faible | 1 | 50 | 2012 - 2016 |
| 63133 | <i>Phengaris aron</i> | (Linnaeus, 1758) <i>Azuré du Serpolet</i> (L.), <i>Azuré d'Arion</i> (L.), <i>Argus à bandes brunes</i> (L.), <i>Argus Arion</i> (L.) | <i>Azuré du Serpolet</i> (L.), <i>Azuré d'Arion</i> (L.), <i>Argus à bandes brunes</i> (L.), <i>Argus Arion</i> (L.) | Reproduction indéterminée | Informateur : DSNE | Fort | 1 | 10 | 2012 - 2013 |
| 54170 | <i>Plebejus argyrogonomon</i> | (Bergsträsser, 1779) <i>Azuré porte-Corailles</i> (L.), <i>Azuré des Argus fêché</i> (L.) | <i>Azuré des Corailles</i> (L.), <i>Azuré porte-Corailles</i> (L.), <i>Argus fêché</i> (L.) | Reproduction indéterminée | Informateur : DSNE | Fort | 1 | 5 | 2012 - 2013 |
| 219756 | <i>Salix pruina</i> | (Linnaeus, 1758) <i>Thécla du Prunier Coudrier</i> (Le), <i>Thécla du Porte-Croque brun à lignes blanches</i> (Le) | <i>Thécla du Prunier Coudrier</i> (Le), <i>Thécla du Porte-Croque brun à lignes blanches</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : DSNE | Fort | 1 | 1 | 2013 - 2014 |

| Code CD_NOM | Code Espèce | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|---|--|--|-----------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 459628 | <i>Epidæa calanthe</i> | (Laurénf, 1766) <i>Crapaud calamite</i> (Le) | <i>Crapaud calamite</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : DSNE | Fort | 1 | 1 | 2012 - 2012 |
| 281 | <i>Hyla arborea</i> | (Linnaeus, 1758) <i>Ranette verte</i> (La) | <i>Ranette verte</i> (La) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DSNE | Moyen | 1 | 20 | 2011 - 2017 |
| 252 | <i>Pelodytes punctatus</i> | (Daudin, 1803) <i>Pélodyte ponctuée</i> (La) | <i>Pélodyte ponctuée</i> (La) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DSNE | Fort | 2 | 2 | 2013 - 2013 |
| 351 | <i>Rana temporaria</i> | Linnaeus, 1758 <i>Grenouille rousse</i> (La) | <i>Grenouille rousse</i> (La) | Reproduction probable | Informateur : DSNE | Moyen | 2 | 32 | 2012 - 2016 |
| 139 | <i>Triturus cristatus</i> | (Laurénf, 1768) <i>Triton crête</i> (Le) | <i>Triton crête</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : DSNE | Moyen | 1 | 30 | 2011 - 2017 |
| 150 | <i>Triturus cristatus</i> | <i>Triton de Blasius</i> (Le) | <i>Triton de Blasius</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : DSNE | Fort | 1 | 8 | 2010 - 2017 |
| 163 | <i>Triturus marmoratus</i> | (Latreille, 1800) <i>Triton marbré</i> (Le) | <i>Triton marbré</i> (Le) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DSNE | Moyen | 1 | 26 | 2011 - 2017 |
| 52115 | <i>Libellodes jonctionis</i> | (Linnaeus, 1764) <i>Ascalaphe ambre</i> | <i>Ascalaphe ambre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : DSNE | Faible | 1 | 1000 | 2005 - 2017 |
| 53370 | <i>Aethusana aethusa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | <i>Mercure</i> (Le), <i>Petit Agriste</i> (Le) | <i>Mercure</i> (Le), <i>Petit Agriste</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : DSNE | Moyen | 1 | 20 | 2012 - 2014 |

7.1 Espèces déterminantes

7. ESPÈCES

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|---|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 219755 | <i>Satyrion w-album</i> (Knoch, 1782) | Thécla de l'Orme (La), Thécla à W blanc (La), W blanc (Le), Thécla W-album (La), Thécla W-Blanc (La), Porte-Queue brun à une ligne blanche (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : DSNE | Fort | 1 | 1 | 2012 - 2014 |
| Mammifères | 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre | Reproduction indéterminée | Informateur : DSNE | Fort | 1 | 1 | 2012 - 2016 |
| | 60658 | <i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758) | Martre des pins, Martre | Reproduction indéterminée | Informateur : DSNE | Fort | 1 | 2 | 1999 - 2017 |
| Odonates | 65133 | <i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840) | Agrion de Mercure | Reproduction indéterminée | Informateur : DSNE | Fort | 1 | 2 | 1998 - 2016 |
| | 199694 | <i>Cordulegaster boltonii</i> (Donovan, 1807) | Cordulégastre annelé (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : DSNE | Fort | 1 | 1 | 2003 - 2012 |
| | 65214 | <i>Lestes dryas</i> Kirby, 1890 | Leste des bois, Leste dryade | Reproduction indéterminée | Informateur : DSNE | Moyen | 1 | 30 | 2013 - 2013 |
| | 65202 | <i>Lestes virens</i> (Charpentier, 1825) | Leste verdoyant | Reproduction indéterminée | Informateur : DSNE | Fort | 2 | 2 | 2013 - 2013 |
| Oiseaux | 2891 | <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758) | Autour des palombes | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres | | | | 2009 - 2016 |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Héron cendré | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres | | | | 2012 - 2015 |
| | 3525 | <i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763) | Hibou des marais | Reproduction indéterminée | Informateur : Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres | | | | 2014 - 2014 |
| | 3120 | <i>Burhinus oediconemus</i> (Linnaeus, 1758) | Oediconème criard | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres | | | | 2012 - 2017 |

-9/ 21 -

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-----------------------------------|----------------------|--|------------------------------|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres | | 50 | 50 | 1991 - 2017 |
| | 3540 | <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | Engoulevent d'Europe | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres | | | | 2012 - 2016 |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | Busard Saint-Martin | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres | | | | 2012 - 2017 |
| Passage, migration | | | | Informateur : Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres | | | | 2012 - 2017 | |
| Reproduction certaine ou probable | | | | Informateur : Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres | | | | 2012 - 2017 | |
| | 2887 | <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758) | Busard cendré | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres | | | | 1991 - 2017 |
| | 3608 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758) | Pic noir | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres | | | | 2014 - 2015 |
| | 2836 | <i>Elanus caeruleus</i> (Desfontaines, 1789) | Élanion blanc | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres | | | | 2014 - 2014 |
| | 4665 | <i>Emberiza hortulana</i> Linnaeus, 1758 | Bruant ortolan | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres | Fort | | | 2014 - 2015 |
| | 2679 | <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758 | Faucon hobereau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres | | | | 2012 - 2017 |
| | 3595 | <i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758 | Torcol fourmilier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres | | | | 2012 - 2017 |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | Pie-grièche écorcheur | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres | | | | 2012 - 2017 |

-10/ 21 -

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|--|--|---|--|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4460 | <i>Lanius senator</i> (Linnaeus, 1758) | Pie-grièche à tête rousse | Reproduction indéterminée | Informateur : Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres | | | | 2013 - 2013 |
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | Alouette lulu | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres | | | | 2016 - 2016 |
| | 2576 | <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758) | Courlis cendré | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres | | | | 1991 - 2017 |
| | 3489 | <i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758) | Hibou petit-duc, Petit-duc scops | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres | | | | 2003 - 2017 |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | Bondrée apivore | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres | | | | 2012 - 2017 |
| | 3161 | <i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus, 1758) | Pluvier doré | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres | | | | 1991 - 2017 |
| | 2767 | <i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758) | Tadome de Belon | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres | | | | 2013 - 2013 |
| | 3089 | <i>Tetrax tetrax</i> (Linnaeus, 1758) | Outarde canepetière | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres | | | | 2012 - 2017 |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres | Fort | 8 | 8 | 2003 - 2017 |
| 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | Vanneau huppé | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres | | | | 1991 - 2017 | |
| | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres | | | | 1991 - 2017 | |
| Orthoptères | 66136 | <i>Chorthippus mollis</i> (Charpentier, 1825) | | Reproduction indéterminée | Informateur : DSNE | Moyen | 1 | 50 | 2013 - 2017 |

-11/ 21 -

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 65878 | <i>Conocephalus dorsalis</i> (Latreille, 1804) | Conocéphale des Roseaux | Reproduction indéterminée | Informateur : DSNE | Fort | 2 | 2 | 2016 - 2016 |
| | 65899 | <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> (Linnaeus, 1758) | Courtilière commune, Courtilière, Taupe-Grillon, Perce-chaussée, Taupette, Avant-taube, Ecrevisse de terre, Loup de terre | Reproduction indéterminée | Informateur : DSNE | Fort | 1 | 1 | 2014 - 2017 |
| | 240286 | <i>Mecostethus parapleurus</i> (Hagenbach, 1822) | Criquet des Roseaux, Parapleure alliacé | Reproduction indéterminée | Informateur : DSNE | Fort | 1 | 3 | 2013 - 2016 |
| | 66223 | <i>Paracrinema tricolor</i> (Thunberg, 1815) | Criquet tricolore | Reproduction indéterminée | Informateur : DSNE | Fort | 1 | 1 | 2011 - 2011 |
| | 66100 | <i>Stenobothrus lineatus</i> (Panzer, 1796) | Criquet de la Palène, Sténobothre ligné, Criquet du Brachypode | Reproduction indéterminée | Informateur : DSNE | Fort | 1 | 1 | 2013 - 2013 |
| | 66103 | <i>Stenobothrus stigmaticus</i> (Rambur, 1838) | Sténobothre nain | Reproduction indéterminée | Informateur : DSNE | Fort | 10 | 10 | 2013 - 2014 |
| | 65487 | <i>Stethophyma grossum</i> (Linnaeus, 1758) | Criquet ensanglanté, Cédipode ensanglantée | Reproduction indéterminée | Informateur : DSNE | Fort | 1 | 2 | 2011 - 2016 |
| | 66039 | <i>Tetrix depressa</i> Brisout de Barneville, 1848 | Tétrix déprimé | Reproduction indéterminée | Informateur : DSNE | Fort | 2 | 5 | 2015 - 2016 |
| | 65618 | <i>Tylopsis lillifolia</i> (Fabricius, 1793) | Phanéroptère liliacé, Phi.Inéroptère feuille-de-lys, Sauterelle feuille-de-lys | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DSNE | Fort | 1 | 10 | 2011 - 2017 |

218

-12/ 21 -

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 80212 | <i>Adonis annua</i> L., 1753 | Goutte de sang, Adonis annuelle, Adonis d'automne | Reproduction certaine ou probable | Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2019. Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine. [https://obv-na.fr/] | | | | 2007 - 2018 |
| | 82283 | <i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | Orchis à fleurs lâches | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NR (Société Française d'Orchidophilie Poitou-Charentes Vendée) | | | | 2009 - 2017 |
| | 87102 | <i>Bupleurum subovatum</i> Link ex Spreng., 1813 | Buplèvre ovale, Buplèvre à ombelles réduites | Reproduction certaine ou probable | Informateur : R.BISSOT (Deux Sèvres Nature Environnement) | | 50 | 100 | 2007 - 2007 |
| | 88578 | <i>Carex hostiana</i> DC., 1813 | Laïche blonde | Reproduction certaine ou probable | Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2019. Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine. [https://obv-na.fr/] | | | | 2019 - 2019 |
| | 92097 | <i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm., 1820 | Orchis vert, Orchis grenouille, Satyrion vert | Reproduction certaine ou probable | Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2019. Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine. [https://obv-na.fr/] | | | | 2009 - 2009 |
| | 94252 | <i>Dactylorhiza elata</i> (Poir.) Soó, 1962 | Orchis élevé | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79) | | | | |
| | 94257 | <i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó, 1962 | Orchis de Fuchs, Orchis tacheté des bois, Orchis de Meyer, Orchis des bois | Reproduction certaine ou probable | Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2019. Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine. [https://obv-na.fr/] | | | | 2007 - 2007 |
| | 94259 | <i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó, 1962 | Dactylorhize incarnate, Orchis incarnat, Orchis couleur de chair | Reproduction certaine ou probable | Informateur : A.ARDOUIN (Sans Organisme) | | | | 2009 - 2009 |
| | 96456 | <i>Epipactis muelleri</i> Godfrey, 1921 | Épipactis de Müller | Reproduction certaine ou probable | Informateur : F.CONORT (Deux Sèvres Nature Environnement) | | | | 2014 - 2014 |
| | 97601 | <i>Euphorbia palustris</i> L., 1753 | Euphorbe des marais | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROBERT LEVESQUE | | 100 | | 1960 - 1960 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 98977 | <i>Fritillaria meleagris</i> L., 1753 | Pintade, Fritillaire damier, Fritillaire pintade | Reproduction certaine ou probable | Informateur : A.ARDOUIN (Sans Organisme) | | | | 2009 - 2009 |
| | 99390 | <i>Galium boreale</i> L., 1753 | Gaillet boréal | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROBERT LEVESQUE | Moyen | | | |
| | 99410 | <i>Galium debile</i> Desv., 1818 | Gaillet faible, Gaillet chétif | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| | 99566 | <i>Galium tricorutum</i> Dandy, 1957 | Gaillet à trois cornes | Reproduction certaine ou probable | Informateur : R.BISSOT (Deux Sèvres Nature Environnement) | Moyen | 100 | 100 | 2007 - 2007 |
| | 104337 | <i>Juncus striatus</i> Schousb. ex E.Mey., 1822 | Jonc strié | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | Faible | | | |
| | 104764 | <i>Lactuca perennis</i> L., 1753 | Laitue vivace, Lâche | Reproduction certaine ou probable | Informateur : F.CONORT (Deux Sèvres Nature Environnement) | | | | 2013 - 2013 |
| | 105241 | <i>Lathyrus pannonicus</i> (Jacq.) Garcke, 1863 | Gesse de Pannonie | Reproduction certaine ou probable | Informateur : A.ARDOUIN (Sans Organisme) | | | | 2009 - 2009 |
| | 105407 | <i>Legousia hybrida</i> (L.) Delarbre, 1800 | Spéculaire miroir de Vénus, Miroir de Vénus hybride, Spéculaire hybride, Petite Spéculaire | Reproduction certaine ou probable | Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2019. Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine. [https://obv-na.fr/] | | | | 2018 - 2018 |
| | 105410 | <i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix, 1785 | Miroir de Vénus, Spéculaire miroir, Mirette | Reproduction certaine ou probable | Informateur : A.LE FOULER (Deux-Sèvres Nature Environnement) | | | | 2008 - 2008 |
| | 105641 | <i>Lepidium latifolium</i> L., 1753 | Passerage à feuilles larges, Grande Passerage | Reproduction certaine ou probable | Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2019. Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine. [https://obv-na.fr/] | | | | 2017 - 2017 |
| | 109631 | <i>Nigella hispanica</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2019. Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine. [https://obv-na.fr/] | | | | 2018 - 2018 |

219

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 109833 | <i>Odontiles jaubertianus</i> (Boreau) D.Dietr. ex Walp., 1844 | Odontite de Jaubert, Odontités de Jaubert | Reproduction certaine ou probable | Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2019. Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine. [https://obv-na.fr/] | | | | 2018 - 2018 |
| | 109838 | <i>Odontites luteus</i> (L.) Clairv., 1811 | Euphrase jaune, Odontites jaune | Reproduction certaine ou probable | Informateur : A.ARDOUIN (Sans Organisme) | | | | 2009 - 2009 |
| | 110346 | <i>Ophrys argensonensis</i> Guérin & Merlet, 1998 | Ophrys de l'Argenson | Reproduction certaine ou probable | Informateur : R.BISSOT (Deux Sèvres Nature Environnement) | | | | 2007 - 2007 |
| | 110392 | <i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench, 1802 | Ophrys bourdon, Ophrys frelon | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JC.GUERIN (Société Française d'Orchidophilie Poitou-Charentes Vendée) | | | | 2001 - 2001 |
| | 110395 | <i>Ophrys fusca</i> Link, 1800 | Ophrys brun | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROBERT LEVESQUE | | | | |
| | 110425 | <i>Ophrys lutea</i> Cav., 1793 | Ophrys jaune | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROBERT LEVESQUE | | | | |
| | 110465 | <i>Ophrys santonica</i> J.M.Mathé & Melki, 1994 | Ophrys de Conrad, Ophrys de Marcelle Conrad | Reproduction certaine ou probable | Informateur : F.CONORT (Deux Sèvres Nature Environnement) | | | | 2013 - 2013 |
| | 110885 | <i>Orchis incarnata</i> L., 1755 | Dactylothize incarnate, Orchis incarnat, Orchis couleur de chair | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROBERT LEVESQUE | | 100 | | 1960 - 1960 |
| | 110920 | <i>Orchis militaris</i> L., 1753 | Orchis militaire, Casque militaire, Orchis casqué | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NR (Société Française d'Orchidophilie Poitou-Charentes Vendée) | | | | 2009 - 2009 |
| | 110948 | <i>Orchis palustris</i> Jacq., 1786 | Orchis des marais | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROBERT LEVESQUE | | 10 | | |
| | 116932 | <i>Ranunculus arvensis</i> L., 1753 | Renoncule des champs, Chaussée-trappe des blés | Reproduction certaine ou probable | Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2019. Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine. [https://obv-na.fr/] | | | | 2018 - 2018 |

-15/ 21 -

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 120758 | <i>Sanguisorba officinalis</i> L., 1753 | Grande pimprenelle, Sanguisorbe, Sanguisorbe officinale, Pimprenelle officinale | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GASTON BONIN (Cercle des naturalistes 79) | | | | |
| | 122810 | <i>Serapias lingua</i> L., 1753 | Sérapias langue, Sérapias à languette | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NR (Société Française d'Orchidophilie Poitou-Charentes Vendée) | | | | 2008 - 2008 |
| | 123789 | <i>Sisymbrella aspera</i> (L.) Spach, 1838 | Cresson rude | Reproduction certaine ou probable | Informateur : F.CONORT (Deux Sèvres Nature Environnement) | | | | 2013 - 2013 |
| | 126159 | <i>Thalictrum minus</i> L., 1753 | Petit pigamon, Pigamon mineur, Pigamon des dunes | Reproduction certaine ou probable | Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2019. Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine. [https://obv-na.fr/] | | | | 2017 - 2017 |
| | 126474 | <i>Thymelaea passerina</i> (L.) Coss. & Germ., 1861 | Passerine annuelle, Langue-de-moineau | Reproduction certaine ou probable | Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2019. Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine. [https://obv-na.fr/] | | | | 2018 - 2018 |
| | 127429 | <i>Trifolium patens</i> Schreb., 1804 | Trèfle étalé | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JEAN TERRISSE | | | | |
| Reptiles | 78130 | <i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758) | Vipère aspic (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : DSNE | Fort | 1 | 3 | 2013 - 2014 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Lépidoptères | 54265 | <i>Lysandra coridon</i> (Poda, 1761) | Argus bleu-nacré (L) | Reproduction indéterminée | Informateur : DSNE | Fort | 1 | 2 | 2012 - 2013 |
| Mammifères | 60345 | <i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774) | Barbastelle d'Europe, Barbastelle | Reproduction indéterminée | Informateur : DSNE | Moyen | 1 | 15 | 2014 - 2017 |

-16/ 21 -

**Annexe 3. CARTE CONSEIL GÉNÉRAL 79 SUR
LES ENJEUX ORNITHOLOGIQUES**