

VIII. 4. d. Synthèse des enjeux « espèces » en période de nidification

En appliquant la méthodologie détaillée dans la partie Chapitre 1 :IV. 1. a – Etablissement de la patrimonialité, un enjeu « espèce » a été attribué à chaque taxon.

L'enjeu « espèce » très fort est attribué au Pic noir, à la Fauvette pitchou, au Bihoreau gris, au Héron pourpré et au Hibou des marais. Ces espèces sont inscrites à l'Annexe I de la DO avec un statut de conservation régional qui considère ces espèces nicheuses comme « Vulnérable » ou « En danger » en Poitou-Charentes. Ces espèces sont également déterminantes ZNIEFF si elles sont nicheuses.

L'enjeu « espèce » fort est attribué à l'Alouette lulu, au Busard Saint-Martin, au Busard cendré, au Canard chipeau, au Fuligule morillon, au Courlis cendré, l'Echasse blanche, à l'Ædicnème criard, au Pigeon colombin, au Martin-pêcheur, à la Mésange noire, à la Mésange huppée, à la Mésange nonnette, au Pouillot siffleur, à la Rousserolle effarvatte, au Pic mar, au Phragmite des joncs, au Moineau friquet, à la Pie-grièche à tête rousse et la Pie grièche écorcheur. Huit de ces espèces sont inscrites à l'Annexe I de la DO avec un statut de conservation régional qui considère ces espèces nicheuses comme « quasi menacées » en Poitou-Charentes.

Les autres espèces non inscrites à la DO, ont un enjeu fort en raison de la régression de leur population au niveau régional, les classant comme « En danger », « Vulnérable » ou « En danger critique » sur la Liste rouge régionale. Toutes ces espèces hormis la Martin-pêcheur sont déterminantes ZNIEFF si elles sont nicheuses.

L'enjeu « espèce » modéré est attribué au Milan noir, à l'Aigle botté, à l'Autour des palombes, à la Bondrée apivore, au Busard des roseaux, au Canard souchet, au Fuligule milouin, à l'Engoulevent d'Europe, au Faucon hobereau, au Râle d'eau, à la Gorgebleue à miroir, à l'Aigrette garzette et à la Grande Aigrette.

Huit de ces espèces sont inscrites à l'Annexe I de la DO. Leur statut de conservation va de non applicable (NA) qui concerne les espèces nicheuses très rares en Poitou-Charentes, à « Vulnérable » en passant par « Quasi menacée » et « réoccupation mineure ». Toutes ces espèces sont déterminantes ZNIEFF si elles sont nicheuses.

L'enjeu « espèce » faible est attribué à la Mouette rieuse, au Petit Gravelot, au Vanneau huppé, à la Tourterelle des bois, à la Caille des blés, à l'Alouette des champs, au Bruant proyer, au Gobemouche gris, au Roitelet huppé, au Grand Cormoran, au Grèbe huppé et à l'Effraie des clochers. Hormis le Gobemouche qui est « Quasi menacée » les autres espèces ont un statut de conservation régional « Vulnérable ». Quatre sont également déterminantes ZNIEFF si elles sont nicheuses (Mouette rieuse, Petit Gravelot, Vanneau huppé et Gobemouche gris).

Le Martinet noir, le Faucon crécerelle, le Tadorne de Belon, la Gallinule Poule d'eau, la Chevêche d'Athéna, le Pic épeichette et seize passereaux ont un état de conservation préoccupant (espèces « quasi menacées ») ce qui leur vaut un enjeu « espèce » très faible sur l'AEI.

Toutes les autres espèces observées ne comportent pas de caractère de patrimonialité, il ne leur est donc pas attribué d'enjeu.

72 espèces ont été observées sur l'aire d'étude immédiate dont 8 inscrites à l'Annexe I de la Directive Oiseaux, 11 déterminantes ZNIEFF (si nicheuses) et 25 ont un statut de conservation régional préoccupant. Au total, ce sont 28 espèces qui sont patrimoniales sur l'AEI

L'AEI est fréquentée lors de la période de reproduction par des espèces qui se reproduisent, qui font de la recherche alimentaire, ou qui la survolent (en transit) entre différents sites (boisements ou étangs par exemple).

Suite aux inventaires et au recueil bibliographique, 73 espèces présentent un enjeu de très faible à très fort :

- **4 espèces représentent un enjeu très fort** : Pic noir et Hibou des marais, Busard des roseaux, Bondrée apivore
- **23 espèces représentent un enjeu fort** : Autour des palombes, Busard cendré, Busard Saint-Martin, Canard chipeau, Fuligule morillon, Courlis cendré, Echasse blanche, Mouette rieuse, Petit Gravelot, Ædicnème criard, Pigeon colombin, Martin-pêcheur, Pic mar, Pie-grièche écorcheur, Alouette lulu et 8 autres passereaux.
- **12 espèces représentent un enjeu modéré** : 4 rapaces, Canard souchet, Fuligule milouin, Engoulevent d'Europe, Vanneau huppé, Faucon hobereau, Râle d'eau, Gorgebleue à miroir de Nantes, Aigrette garzette, Grande Aigrette
- **11 espèces représentent un enjeu faible** : Tadorne de Belon, Tourterelle des Bois, Caille des blés, Alouette des champs, Bruant proyer, Gobemouche gris, Mésange huppée, Roitelet huppé, Grand Cormoran, Grèbe huppé, Effraie des clochers, Héron pourpré.
- **21 espèces représentent un enjeu très faible** : Tadorne de Belon, Martinet noir, Faucon crécerelle, Chevêche d'Athéna, Gallinule poule d'eau, Pic épeichette et 15 passereaux.

Tableau 56 : Enjeu « espèce » attribué en période de nidification

Ordre	Nom commun	Statut réglementaire	LRR – Nicheur	ZNIEFF – Deux-Sèvres	Effectif maximum retenu	Enjeu "espèce"
Accipitriformes	Aigle botté	DO / PN	NA	Si nicheur	Biblio	Modéré
	Autour des palombes	PN	VU	Si nicheur	Biblio	Fort
	Bondrée apivore	DO / PN	VU	Si nicheur	Biblio	Très Fort
	Busard cendré	DO / PN	NT	Si nicheur	Biblio	Fort
	Busard des roseaux	DO / PN	VU	Si nicheur	Biblio	Très Fort
	Busard Saint-Martin	DO / PN	NT	Si nicheur	1	Fort
	Buse variable	PN	LC	/	11	
	Elanion blanc	DO / PN	NA	Si nicheur	Biblio	Modéré
	Epervier d'Europe	PN	LC	/	1	
	Milan noir	DO / PN	LC	Si nicheur	8	Modéré
	Anseriformes	Canard chipeau		EN	Si nicheur	Biblio
Canard colvert			LC	/	26	
Canard souchet			VU	Si nicheur	Biblio	Modéré
Cygne tuberculé		PN	LC	/	Biblio	
Fuligule Milouin			VU	Si nicheur	Biblio	Modéré
Fuligule morillon			CR	Si nicheur	Biblio	Fort
Tadorne de Belon		PN	LC	Si nicheur	Biblio	Faible
Apodiformes	Martinet noir	PN	NT	/	5	Très faible
Bucerotiformes	Huppe fasciée	PN	LC	/	2	
Caprimulgiformes	Engoulevent d'Europe	DO / PN	LC	Si nicheur	Biblio	Modéré
Charadriiformes	Courlis cendré		EN	Si nicheur	Biblio	Fort
	Echasse blanche	DO / PN	NT	Si nicheur	Biblio	Fort
	Mouette rieuse	PN	VU	Si nicheur	58	Fort
	Édicnème criard	DO / PN	NT	Si nicheur	4	Fort
	Petit Gravelot	PN	VU	Si nicheur	Biblio	Fort
	Vanneau huppé		VU	Si nicheur	3	Modéré
Columbiformes	Pigeon colombin		EN	Si nicheur	Biblio	Fort
	Pigeon ramier		LC	/	15	
	Tourterelle des bois		VU	/	6	Faible
	Tourterelle turque		LC	/	1	
Coraciiformes	Martin-pêcheur	DO / PN	NT	/	Biblio	Fort
Cuculiformes	Coucou gris	PN	LC	/	11	
Falconiformes	Faucon crécerelle	PN	NT	/	3	Très faible
	Faucon hobereau	PN	NT	Si nicheur	Biblio	Modéré
Galliformes	Caille des blés		VU	/	Biblio	Faible
	Faisan de Colchide		DD	/	4	
	Perdrix grise		DD	/	2	
	Perdrix rouge		DD	/	1	
Gruiformes	Foulque macroule	PN	LC	/	6	

Ordre	Nom commun	Statut réglementaire	LRR – Nicheur	ZNIEFF – Deux-Sèvres	Effectif maximum retenu	Enjeu "espèce"
	Gallinule Poule-d'eau		NT	/	2	Très faible
	Râle d'eau		VU	Si nicheur	Biblio	Modéré
Passériformes	Accenteur mouchet	PN	LC	/	6	
	Alouette des champs		VU	/	7	Faible
	Alouette lulu	DO / PN	NT	Si nicheur	6	Fort
	Bergeronnette des ruisseaux	PN	LC	/	Biblio	
	Bergeronnette grise	PN	LC	/	6	
	Bergeronnette printanière	PN	LC	/	1	
	Bouscarle de Cetti	PN	LC	/	1	
	Bruant des roseaux	PN	EN	Si Nicheur	Biblio	Fort
	Bruant jaune	PN	NT	/	1	Très faible
	Bruant proyer	PN	VU	/	1	Faible
	Bruant zizi	PN	LC	/	4	
	Chardonneret élégant	PN	NT	/	8	Très faible
	Choucas des tours	PN	NT	/	Biblio	Très faible
	Cisticole des joncs	PN	NT	/	Biblio	Très faible
	Cochevis huppé	PN	LC	/	Biblio	
	Corbeau freux		LC	/	Biblio	
	Corneille noire		LC	/	18	
	Etourneau sansonnet		LC	/	68	
	Fauvette à tête noire	PN	LC	/	27	
	Fauvette des jardins	PN	NT	/	Biblio	Très faible
	Fauvette grisette	PN	NT	/	9	Très faible
	Fauvette pitchou	DO / PN	VU	Si nicheur	Biblio	Très fort
	Geai des chênes		LC	/	4	
	Gobemouche gris	PN	NT	Si nicheur	Biblio	Faible
	Gorgebleue à miroir	DO / PN	LC	Si nicheur	Biblio	Modéré
	Grimpereau des jardins	PN	LC	/	5	
	Grive draine		NT	/	Biblio	Très faible
	Grive musicienne		LC	/	3	
	Grosbec casse-noyaux	PN	NT	/	Biblio	Très faible
	Hirondelle de fenêtre	PN	NT	/	1	Très faible
Hirondelle rustique	PN	NT	/	13	Très faible	
Hypolaïs polyglotte	PN	LC	/	8		
Linotte mélodieuse	PN	NT	/	5	Très faible	
Loriot d'Europe	PN	LC	/	3		
Merle noir		LC	/	16		
Mésange à longue queue	PN	LC	/	10		
Mésange bleue	PN	LC	/	12		

Ordre	Nom commun	Statut réglementaire	LRR – Nicheur	ZNIEFF – Deux-Sèvres	Effectif maximum retenu	Enjeu "espèce"
	Mésange charbonnière	PN	LC	/	17	
	Mésange huppée	PN	VU	/	Biblio	Faible
	Mésange noire	PN	CR	Si nicheur	Biblio	Fort
	Mésange nonnette	PN	VU	Si nicheur	Biblio	Fort
	Moineau domestique	PN	NT	/	2	Très faible
	Moineau friquet	PN	EN	Si nicheur	Biblio	Fort
	Phragmite des joncs	PN	VU	Si nicheur	Biblio	Fort
	Pie bavarde		LC	/	6	
	Pie-grièche à tête rousse	PN	EN	Si nicheur	Biblio	Fort
	Pie-grièche écorcheur	DO / PN	NT	Si nicheur	3	Fort
	Pinson des arbres	PN	LC	/	25	
	Pipit des arbres	PN	LC	/	10	
	Pouillot de Bonelli	PN	NT	/	Biblio	Très faible
	Pouillot siffleur	PN	EN	Si nicheur	Biblio	Fort
	Pouillot véloce	PN	LC	/	21	
	Roitelet à triple bandeau	PN	LC	/	3	
	Roitelet huppé	PN	VU	/	Biblio	Faible
	Rossignol philomèle	PN	LC	/	19	
	Rougegorge familier	PN	LC	/	4	
	Rougequeue à front blanc	PN	LC	/	Biblio	
	Rougequeue noir	PN	LC	/	1	
	Rousserolle effarvatte	PN	VU	Si nicheur	Biblio	Fort
	Serin cini	PN	NT	/	Biblio	Très faible
	Sittelle torchepot	PN	LC	/	2	
	Tarier pâtre	PN	NT	/	Biblio	Très faible
	Troglodyte mignon	PN	LC	/	4	
	Verdier d'Europe	PN	NT	/	6	Très faible
Péléciformes	Aigrette garzette	DO / PN	LC	Si nicheur	2	Modéré
	Grand Cormoran	PN	VU	/	8	Faible
	Grande Aigrette	DO / PN	NA	Si nicheur	1	Modéré
	Héron cendré	PN	LC	Si nicheur	4	
	Héron garde-bœufs	PN	LC	Si nicheur	3	
	Héron pourpré	DO / PN	VU	Si nicheur	Biblio	Très fort
Phoenicopteriformes	Grèbe huppé	PN	VU	/	Biblio	Faible
Piciformes	Pic épeiche	PN	LC	/	4	
	Pic épeichette	PN	NT	/	1	Très faible
	Pic mar	DO / PN	NT	Si nicheur	Biblio	Fort
	Pic noir	DO / PN	VU	Si nicheur	1	Très fort
		Pic vert	PN	LC	/	6
Podicipediformes	Grèbe castagneux	PN	LC	/	Biblio	

Ordre	Nom commun	Statut réglementaire	LRR – Nicheur	ZNIEFF – Deux-Sèvres	Effectif maximum retenu	Enjeu "espèce"
Strigiformes	Chevêche d'Athéna	PN	NT	Si nicheur	12	Très faible
	Chouette hulotte	PN	LC	/	6	
	Effraie des clochers	PN	VU	/	7	Faible
	Hibou des marais	DO / PN	CR	Si nicheur	Biblio	Très fort
	Hibou moyen-duc	PN	LC	/	1	

Légende :

Statut réglementaire : PN : Espèces protégées au niveau national ; DO : Directive 2009/147/CE du 20 novembre 2009, dite Directive "Oiseaux", relative à la conservation des oiseaux sauvages (Annexe I)

Catégories de la Liste rouge régionale des espèces menacées (nicheur) : NA : espèces « non applicable » ; LC : espèces de « préoccupation mineure » ; NT : espèces « quasi menacées » ; VU : espèces « vulnérables » ; EN : espèces « en danger » ; CR : espèces « en danger critique d'extinction »

Condition pour espèce déterminante ZNIEFF – Deux-Sèvres : Si nicheur

VIII. 5. Synthèse des enjeux ornithologiques

VIII. 5. a. Enjeu des espèces

Parmi les 110 espèces observées sur l'AEI au cours des différentes périodes de prospections et celles connues au sein de l'aire d'étude éloignée (issues des recueils bibliographiques) un total de **116 espèces patrimoniales** sont retenues. Elles sont toutes susceptibles de fréquenter l'AEI à une période donnée.

90 d'entre elles sont **protégées au niveau national**, **48** sont inscrites sur les listes de l'**Annexe I de la Directive « Oiseaux »**. **77 espèces** sont **déterminantes ZNIEFF** dans la région Poitou-Charentes en période de nidification et/ou en période de halte migratoire et d'hivernage. Enfin, **63 espèces** présentent un **statut de conservation défavorable** sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de Poitou-Charentes (2018) :

- 31 sont « quasi-menacées » d'extinction,
- 23 sont « vulnérables »
- 6 sont « en danger » d'extinction
- 3 sont « en danger critique » d'extinction

En appliquant la méthodologie détaillée dans la partie III. 4. a. i - **Etablissement de la patrimonialité**, un enjeu « espèce » a été attribué à chaque taxon patrimonial, suivant la période d'observation (cf. parties précédentes). Le tableau ci-dessous synthétise les espèces retenues et l'enjeu associé.

On rappelle ici que l'enjeu « espèce » ne considère pas la fonctionnalité de la zone d'étude pour celle-ci. Cet enjeu « habitat d'espèce » est détaillé dans la partie suivante.

Tableau 57 : Synthèse des enjeux ornithologiques

Ordre	Nom commun	Nom scientifique	Statut réglementaire	LRR Nicheur PC	Liste rouge France métropolitaine (UICN, 2016)			Espèce déterminante ZNIEFF-PC	Origine des données				Enjeu " espèce "			Enjeu " habitat d'espèces "			
					Nicheur	Hivernant	De passage		Nidification	Migration post-nuptiale	Hivernage	Migration pré-nuptiale	Nidification	Migration	Hivernage	Nidification	Alimentation	Transit / halte migratoire	Hivernage
Accipitriformes	Aigle botté	<i>Hieraaetus pennatus</i>	DO / PN	DD	NT	NA		N	Biblio	Biblio		Biblio	Modéré	Modéré		Modéré		Très faible	
	Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>	PN	VU	LC	NA	NA	N	Biblio				Fort			Très fort			
	Balbusard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>	DO / PN		VU	NA	LC	H		Biblio				Modéré				Faible	
	Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>	DO / PN	VU	LC		LC	N	Biblio	x			Très fort	Modéré		Très fort		Faible	
	Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>	DO / PN	NT	NT		NA	N	Biblio	Biblio		Biblio	Fort	Modéré		Modéré		Faible	
	Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>	DO / PN	VU	NT	NA	NA	N, H >10	Biblio	x	Biblio		Très fort	Modéré	Modéré	Très fort		Faible	Très faible
	Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>	DO / PN	NT	LC	NA	NA	N, H	x		x	x	Fort	Modéré	Modéré	Modéré		Faible	Très faible
	Circaète-Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>	DO / PN	EN	LC		NA	N		x				Modéré				Faible	
	Elanion blanc	<i>Elanus caeruleus</i>	DO / PN	NA	EN		NA	N	Biblio	Biblio	Biblio	Biblio	Modéré	Modéré	Modéré	Modéré		Très faible	Très faible
	Milan noir	<i>Milvus migrans</i>	DO / PN	LC	LC		NA	/	x	x		x	Modéré	Modéré		Fort		Faible	
	Milan royal	<i>Milvus milvus</i>	DO / PN		VU	VU	NA	/		Biblio	Biblio	Biblio		Modéré	Très Fort			Faible	Très faible
Anseriformes	Bernache nonnette	<i>Branta leucopsis</i>	DO / PN			NA	NA	H		Biblio		Biblio		Modéré				Très faible	
	Canard chipeau	<i>Mareca strepera</i>	-	EN	LC	LC	NA	N, H > 35	Biblio	Biblio		Biblio	Fort	Très faible			Faible	Très faible	
	Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	-	LC	LC	LC	NA	H >300		Biblio		Biblio		Très faible				Très faible	
	Canard pilet	<i>Anas acuta</i>	-	NA	NA	LC	NA	H > 15		Biblio		Biblio		Très faible				Très faible	
	Canard siffleur	<i>Mareca penelope</i>	-	NA	NA	LC	NA	H >50		Biblio		Biblio		Très faible				Très faible	
	Canard souchet	<i>Anas clypeata</i>	-	VU	LC	LC	NA	N, H >35	Biblio	Biblio		Biblio	Modéré	Très faible			Faible	Très faible	
	Fuligule milouin	<i>Aythya ferina</i>	-	VU	VU	LC	NA	N, H >80	Biblio	Biblio		Biblio	Modéré	Très faible			Faible	Très faible	
	Fuligule morillon	<i>Aythya fuligula</i>	-	CR	LC	NT		N, H > 40	Biblio	Biblio		Biblio	Fort	Très faible			Faible	Très faible	
	Oie cendrée	<i>Anser anser</i>	-	NA	VU	LC	NA	N, H >20		Biblio		Biblio		Très faible				Très faible	
	Sarcelle d'été	<i>Spatula querquedula</i>	-	CR	VU		NT	N, H		Biblio		Biblio		Faible				Très faible	

Ordre	Nom commun	Nom scientifique	Statut réglementaire	LRR Nicheur PC	Liste rouge France métropolitaine (UICN, 2016)			Espèce déterminante ZNIEFF-PC	Origine des données				Enjeu " espèce "			Enjeu " habitat d'espèces "			
					Nicheur	Hivernant	De passage		Nidification	Migration post-nuptiale	Hivernage	Migration pré-nuptiale	Nidification	Migration	Hivernage	Nidification	Alimentation	Transit / halte migratoire	Hivernage
	Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>	-	EN	VU	LC	NA	N, H>125		Biblio		Biblio		Très faible				Très faible	
	Tadorne de Belon	<i>Tadorna tadorna</i>	PN	LC	LC	LC		N, H > 60	Biblio	Biblio		Biblio	Faible	Faible		Faible		Très faible	
Apodiformes	Martinet noir	<i>Apus apus</i>	PN	NT	NT		DD	/	x				Très faible				Très faible		
Caprimulgiformes	Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europaeus</i>	DO / PN	LC	LC		NA	N	Biblio	Biblio		Biblio	Modéré	Modéré		Fort		Faible	
	Avocette élégante	<i>Recurvirostra avosetta</i>	DO / PN	VU	LC	LC	NA	N, H > 20		Biblio		Biblio		Modéré				Très faible	
	Barge à queue noire	<i>Limosa limosa</i>	-	CR	VU		VU	N, H > 25		Biblio		Biblio		Modéré				Très faible	
	Bécasseau variable	<i>Calidris alpina</i>	PN		NA	LC	NA	H > 310		Biblio		Biblio		Faible				Très faible	
	Chevalier aboyeur	<i>Tringa nebularia</i>	-			NA	LC	H		Biblio		Biblio		Très faible				Très faible	
	Chevalier arlequin	<i>Tringa erythropus</i>	-			NA	DD	H		Biblio		Biblio		Très faible				Très faible	
	Chevalier gambette	<i>Chevalier gambette</i>	-	VU	LC	NA	LC	N, H > 60		Biblio		Biblio		Très faible				Très faible	
	Chevalier Sylvain	<i>Tringa glareola</i>	DO / PN				LC	/		Biblio		Biblio	Fort	Modéré				Très faible	
	Combattant varié	<i>Philomachus pugnax</i>	DO				NT	H		Biblio		Biblio		Fort				Faible	
	Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i>	-	EN	VU	LC	NA	N, H > 35	Biblio	Biblio		Biblio	Fort	Modéré		Fort		Modéré	
	Courlis corlieu	<i>Numenius phaeopus</i>	-			NA	VU	H > 50		Biblio		Biblio		Modéré				Modéré	
	Echasse blanche	<i>Himantopus himantopus</i>	DO / PN	NT	LC			N, H > 50	Biblio	Biblio		Biblio	Fort	Modéré			Faible	Très faible	
	Goéland cendré	<i>Larus canus</i>	PN		EN	LC		H > 15		Biblio	Biblio	Biblio		Faible	Faible				Très faible
	Grand gravelot	<i>Charadrius hiaticula</i>	PN		VU	LC	NA	H > 15		Biblio		Biblio		Faible				Très faible	
	Guifette moustac	<i>Chlidonias hybrida</i>	DO / PN		VU		NA	H > 5		Biblio		Biblio		Modéré				Très faible	
	Guifette noire	<i>Chlidonias niger</i>	DO / PN	CR	EN		DD	N, H > 5		Biblio		Biblio		Modéré				Très faible	
	Mouette mélanocéphale	<i>Ichthyaetus melanocephalus</i>	DO / PN	CR	LC	NA	NA	N, H > 5		Biblio		Biblio		Modéré				Très faible	
	Mouette pygmée	<i>Larus minutus</i>	DO / PN		NA	LC	NA	H > 5		Biblio		Biblio		Modéré				Très faible	
	Mouette rieuse	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	PN	VU	NT	LC	NA	N	x				Fort			Très fort			
	Oedicnème criard	<i>Burhinus oedicnemus</i>	DO / PN	NT	LC	NA	NA	N, H	x		Biblio	x	Fort	Modéré	Modéré	Modéré		Faible	Très faible
	Petit gravelot	<i>Charadrius dubius</i>	PN	VU	LC		NA	N	Biblio				Fort			Très fort			
	Pluvier doré	<i>Pluvialis apricaria</i>	DO			LC		H>35		x	Biblio			Modéré	Modéré			Modéré	Faible
	Pluvier guignard	<i>Charadrius morinellus</i>	DO / PN		RE		NT	H		Biblio		Biblio		Modéré				Très faible	
	Sterne caspienne	<i>Hydroprogne caspia</i>	DO / PN				NT	/		Biblio		Biblio		Modéré				Très faible	
	Sterne caugek	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	DO / PN	NA	NT	NA	LC	/		Biblio		Biblio		Modéré				Très faible	
	Sterne hansel	<i>Gelochelidon nilotica</i>	DO / PN		VU		NA	/		Biblio		Biblio		Modéré				Très faible	
	Sterne naine	<i>Sternula albifrons</i>	DO / PN	NA	LC		LC	/		Biblio		Biblio		Modéré				Très faible	
	Sterne pierregarin	<i>Sterna hirundo</i>	DO / PN	VU	LC	NA	LC	N		Biblio		Biblio		Modéré				Très faible	
	Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>	-	VU	NT	LC	NA	N, H > 260	x	x			Modéré	Très faible		Fort		Très faible	
Ciconiiformes	Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>	DO / PN	NT	LC	NA	NA	N		Biblio	Biblio	Biblio		Modéré	Modéré			Très faible	Très faible
	Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i>	DO / PN	NA	EN	NA	VU	N, H		x		x		Très fort				Faible	
	Spatule blanche	<i>Platalea leucorodia</i>	DO / PN	EN	NT	VU	NA	N, H		Biblio		Biblio		Modéré				Très faible	
Coraciiformes	Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>	DO / PN	NT	VU	NA		/	Biblio	Biblio	Biblio	Biblio	Fort	Modéré	Modéré	Très fort		Faible	Très faible
Columbiformes	Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>		EN	LC	NA	NA	N	Biblio				Fort			Fort			
	Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>	-	VU	VU		NA	/	x				Faible			Modéré			
Falconiformes	Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	PN	NT	NT	NA	NA	/	x				Très faible			Modéré			

Ordre	Nom commun	Nom scientifique	Statut réglementaire	LRR Nicheur PC	Liste rouge France métropolitaine (UICN, 2016)			Espèce déterminante ZNIEFF-PC	Origine des données				Enjeu " espèce "			Enjeu " habitat d'espèces "			
					Nicheur	Hivernant	De passage		Nidification	Migration post-nuptiale	Hivernage	Migration pré-nuptiale	Nidification	Migration	Hivernage	Nidification	Alimentation	Transit / halte migratoire	Hivernage
	Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>	DO / PN			DD	NA	/		Biblio		Biblio		Modéré				Faible	
	Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>	PN	NT	LC		NA	N	Biblio	x			Modéré	Modéré		Fort		Faible	
	Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>	DO / PN	CR	LC	NA	NA	N		x	x			Modéré	Modéré			Faible	Très faible
Galliformes	Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>	-	VU	LC		NA	/	Biblio				Faible			Faible			
	Foulque macroule	<i>Fulica atra</i>	PN	LC	LC	NA	NA	H > 280		Biblio		Biblio		Très faible				Très faible	
Gruiformes	Gallinule poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>	-	NT	LC	NA	NA	/	x				Très faible			Modéré			
	Grue cendrée	<i>Ardea grus</i>	DO / PN		CR	NT	NA	H > 70		x				Modéré				Très faible	
Otidiformes	Outarde canepetière	<i>Tetrax tetrax</i>	DO / PN	EN	EN	NA		N, H		Biblio		Biblio		Modéré				Très faible	
	Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	-	VU	NT	LC	NA	/	x				Faible			Faible			
	Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>	DO / PN	NT	LC	NA		N	x	x	x	x	Fort	Modéré	Modéré	Très fort		Modéré	Modéré
	Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>	PN	EN	EN		NA	N					Fort			Très fort			
	Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>	PN	NT	VU	NA	NA	/	x				Très faible			Modéré			
	Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	DO / PN	EN	EN		EN	N		Biblio		Biblio		Très fort				Faible	
	Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>	PN	VU	LC			/	x				Faible			Faible			
	Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	PN	NT	VU	NA	NA	/	x				Très faible			Modéré			
	Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>	PN	NT	LC	NA	-	/	Biblio				Très faible				Très faible		
	Cisticole des joncs	<i>Cisticola juncidis</i>	PN	NT	VU			/	Biblio				Très faible			Faible			
	Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	PN	NT	NT		DD		Biblio				Très faible			Modéré			
	Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	PN	NT	LC		DD	/	x				Très faible			Modéré			
	Fauvette pitchou	<i>Sylvia undata</i>	DO / PN	VU	EN			N	Biblio	Biblio	Biblio	Biblio	Très fort	Modéré	Modéré	Fort		Modéré	Très faible
	Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>	PN	NT	NT		DD	/	Biblio				Faible			Modéré			
	Gorgebleue à miroir	<i>Luscinia svecica</i>	DO / PN	LC	LC		NA	N	Biblio	Biblio		Biblio	Modéré	Modéré		Faible		Très faible	
	Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>		NT	LC	NA	NA	/	Biblio				Très faible			Modéré			
	Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	PN	NT	LC	NA			Biblio				Très faible			Faible			
	Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>	PN	NT	NT		DD	/	x				Très faible				Très faible		
	Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	PN	NT	NT		DD	/	x				Très faible				Très faible		
	Linotte mélodieuse	<i>Linaria cannabina</i>	PN	NT	VU	NA	NA	/	x				Très faible			Modéré			
	Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i>	PN	VU	LC			/	Biblio				Faible			Faible			
	Mésange noire	<i>Periparus ater</i>	PN	CR	LC	NA	NA	N	Biblio				Fort			Fort			
	Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>	PN	VU	LC			N	Biblio				Fort			Très fort			
	Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	PN	NT	LC		NA	/	x				Très faible				Très faible		
	Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>	PN	EN	EN			N	Biblio				Fort				Faible		
	Phragmite des joncs	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	PN	VU	LC		DD	N	Biblio				Fort			Très fort			
	Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>	PN	EN	VU		NA	N	Biblio				Fort			Fort			
	Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>	DO / PN	NT	NT	NA	NA	N	x	Biblio		Biblio	Fort	Modéré		Très fort		Faible	
	Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>	DO / PN	EN	LC		NA	N		Biblio		Biblio		Modéré				Très faible	
	Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>	PN	NT	LC		NA	/	Biblio				Très faible			Faible			
	Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	PN	EN	NT		NA	N	Biblio				Fort			Fort			
	Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>	PN	VU	NT	NA	NA	/	Biblio				Faible			Modéré			